

Operation for slapt nedre øjenlåg, forkortning.

Nedre øjenlåg kan blive slapt, hvilket kan resultere i rødme, irritation og tåreflod. Ofte skyldes det at øjenlåget er blevet slapt. Denne slaphed kan ofte korrigeres ved at forkorte øjenlåget ved en lille operation.

Operationen foretages i lokalbedøvelse. Det gør ondt og spænder når bedøvelsen anlægges. Herefter gør det sædvanligvis ikke ondt at blive opereret.

Hvis du får blodfortyndende medicin skal du gøre lægen opmærksom på det.

Efter operationen bør du holde dig i ro de første dage, samt afstå fra hård fysisk udfoldelse til 5 dage efter at trådene er fjernet. Det kan være en fordel at have noget koldt (frosne ærter, brun sæbe i en frysepose) klar. Dette kan lægges på det opererede område 4 gange dgl. a 15 minutters varighed de første 3 dage.

Der bliver udskrevet recept på øjendråber som du skal benytte indtil trådene fjernes.

Det kan være nødvendigt at tage evt Tbl. Panodil 500mg x 2, 1-4 gange dgl. ved moderate smerter de første dage.

Risikoen ved denne operation er bla.:

Blå / hævede øjenomgivelser, som kan være ganske udtalt den første uge.

Blødning. Hvis det bløder fra operationssåret kan du sætte dig med hovedet op, og holde noget koldt på – det vil i langt de fleste tilfælde klare problemet.

Infektion. Der er, som ved alle andre operationer, risiko for betændelse i operationssåret, dette er dog meget sjældent ved denne type operation.

Ved evt. Manglende effekt er det som regel muligt at foretage yderligere operation for at opnå det ønskede resultat.

Beskyt arret mod sollys de første 9 mdr.

Skulle der mod forventning opstå komplikationer skal du enten kontakte øjenlægen (normal åbningstid) eller vaglægen.