

Undersøgelse ved forhøjet øjentryk og grøn stær

Forhøjet øjentryk kan, ubehandlet, føre til udvikling af grøn stær.

Hvis der som følge af forhøjet øjentryk er opstået en skade på synsnerven kaldes det grøn stær. Når der opstår skader på synsnerven starter det oftest med, at der kommer områder i synsfeltet, som man ikke kan se med. Der findes mange grader af grøn stær, lige fra umålelige synsfeltdefekter, til det man kalder kikkertsyn (ligesom at se igennem et køkkenrullerør) til total blindhed.

Grøn stær kan udvikle sig meget før man opdager det. Symptomer på grøn stær kan være: Sløret syn, hovedpine, trykken i øjnene, pletter i synsfeltet og f.eks. regnbuesyn.

Heldigvis er det sjældent at sygdommen når at udvikle sig meget før det opdages og behandling startes. Øjets tryk kan nedsættes ved at give øjendråber, laserbehandling eller ved kirurgi.

Det er en god idé at få undersøgt øjets tryk.

Ved en typisk undersøgelse for grøn stær vil du få målt synstyrke, målt øjets tryk, målt synsfelt, ind i mellem få fotograferet synsnerven og blive undersøgt af øjenlægen. Ca hver anden gang vil du få dryppet øjet med øjendråber der udvider pupillen, hvilket kan give let synssløring i 1-2 timer.

Mellemrummet mellem undersøgelserne for forhøjet øjentryk / grøn stær, kan variere mellem år til få måneder, alt efter hvor fremskreden tilstanden er.

Læs mere om grøn stær under Øjensygdomme.