

## Operation for poser under øjnene.

Der kan hos nogle personer komme poser under øjnene som er så store, at de medfører en væsentlig gene. For eksempel, hvis de kommer ud og rører brilleglaset. Disse poser kan fjernes kirurgisk, enten ved at fjerne dem direkte, eller ved at løfte huden ved et snit lige under øjenvipperne på nederste øjenlåg.

Operationen foretages i lokalbedøvelse. Det gør ondt og spænder når bedøvelsen anlægges. Herefter gør det sædvanligvis ikke ondt at blive opereret.

Hvis du får blodfortyndende medicin skal du gøre lægen opmærksom på det.

**Efter operationen** bør du holde dig i ro de første dage, samt afstå fra hård fysisk udfoldelse til 5 dage efter at trådene er fjernet. Det kan være en fordel at have noget koldt ( frosne ærter, brun sæbe i en frysepose ) klar. Dette kan lægges på det opererede område 4 gange dgl. a 15 minutters varighed de første 3 dage.

Det kan være nødvendigt at tage evt Tbl. Panodil 500mg x 2, 1-4 gange dgl. ved moderate smerter de første dage.

**Risikoen** ved denne operation er bla.:

Blå / hævede øjenomgivelser, som kan være ganske udtalt den første uge.

Risiko for at øjenlåget ikke ligger helt til øjenæblet, hvilket kan resultere i kronisk irriteret øje.

Blødning. Hvis det bløder fra operationssåret kan du sætte dig med hovedet op, og holde noget koldt på – det vil i langt de fleste tilfælde klare problemet.

Infektion. Der er, som ved alle andre operationer, risiko for betændelse i operationssåret, dette er dog meget sjældent ved denne type operation.

Ved evt. Manglende effekt er det som regel muligt at foretage yderligere operation for at opnå det ønskede resultat.

Beskyt arret mod sollys de første 9 mdr.

Skulle der mod forventning opstå komplikationer skal du enten kontakte øjenlægen ( normal åbningstid ) eller vaglægen.