

SLT-LASER BEHANDLING

SLT står for "selektiv laser trabekuloplastik".

Øjets indre væske dræneres igennem et finmasket net, ud i blodbanen. Dette finmaskede net kan med tiden holde op med at fungere normalt. Det kan resultere i forhøjet øjentryk. Forhøjet øjentryk kan føre til udvikling af grøn stær.

Ved SLT-laserbehandling påvirkes det finmaskede net således, at øjets indre væske lettere dræneres og som følge heraf, falder øjets tryk.

I nogle tilfælde kan øjendråber helt undværes efter behandlingen. Oftest skal man fortsat dryppe øjne, dog som regel med færre øjendråber.

Behandlingen foregår i lokalbedøvelse med øjendråber. Der påsættes en kontaktlinse og behandlingen udføres. Det gør ikke ondt at få SLT-laser behandling.

På behandlingsdagen skal du møde en halv time før behandlingen, hvor du får to øjendråber.

Efter behandlingen får Du en tryksænkende tablet og Du skal dryppe med Øjendråber Flurolon 3 gange dagligt i 3 dage.

Du skal fortsætte med de tryksænkende øjendråber som øjenlægen ordinerer.

Der kan være uro og lette smerter i øjet døgnet efter operationen, dette er normalt. Kommer der stærke smerter og kvalme kontaktes øjenlægen. Aften og week-end kontaktes vagtlægen.

Risici ved behandlingen er sjældne, herunder:

Ridse på hornhinden (heler som regel i løbet af et døgn), Trykstigning umiddelbart efter behandlingen (falder oftest i løbet af et par timer). Herudover kommer der meget sjældent forbigående hævelse på nethinden. Der er også risiko for at behandlingen ingen effekt har.