

## Operation for hængende øjenbryn.

Bliver øjenbrynene så tunge at de generer udsynet kan der opereres for det.

Operationen foretages i lokalbedøvelse. Det gør ondt og spænder når bedøvelsen anlægges. Herefter gør det sædvanligvis ikke ondt at blive opereret.

Hvis du får blodfortyndende medicin skal du gøre lægen opmærksom på det.

**Efter operationen** bør du holde dig i ro de første dage, samt afstå fra hård fysisk udfoldelse til 5 dage efter at trådene er fjernet. Det kan være en fordel at have noget koldt ( frosne ærter, brun sæbe i en frysepose ) klar. Dette kan lægges på det opererede område 4 gange dgl. a 15 minutters varighed de første 3 dage.

**Risikoen** ved denne operation er bla.:

Blå / hævede øjenomgivelser, som kan være ganske udtalt den første uge.

Blødning. Hvis det bløder fra operationssåret kan du sætte dig med hovedet op, og holde noget koldt på – det vil i langt de fleste tilfælde klare problemet.

Infektion. Der er, som ved alle andre operationer, risiko for betændelse i operationssåret, dette er dog meget sjældent ved denne type operation.

Over / underkorrektion. Pandens hud er meget elastisk. Dette kan betyde at øjenbrynet ikke kommer til at sidde præcist der hvor man ønskede det – trods grundig opmåling før operationen.

I meget sjældne tilfælde kan der komme påvirkning af følesansen i panden som følge af nerveskade. Der kan også komme et synligt ar over øjenbrynet. Beskyt arret mod sollys de første 9 mdr.

Skulle der mod forventning opstå komplikationer skal du enten kontakte øjenlægen ( normal åbningstid ) eller vaglægen.