

Operation for hængende øjenlåg (ptose).

Hængende øjenlåg opstår ofte ved at den muskel der løfter det øverste øjenlåg, mister sit greb i øjenlågs-kanten. Herved kommer øjenlåget til at hænge. Ved operation fanges denne muskel og syes på plads der hvor den oprindeligt sad.

Operationen foretages i lokalbedøvelse. Det gør ondt og spænder når bedøvelsen anlægges. Herefter gør det sædvanligt ikke ondt at blive opereret.

Hvis du får blodfortyndende medicin skal du gøre lægen opmærksom på det.

Efter operationen bør du holde dig i ro de første dage, samt afstå fra hård fysisk udfoldelse til 5 dage efter at trådene er fjernet. Det kan være en fordel at have noget koldt (frosne ærter, brun sæbe i en frysepose) klar. Dette kan lægges på det opererede område 4 gange dgl. a 15 minutters varighed de første 3 dage.

Risikoen ved denne operation er bla.:

Blå / hævede øjenomgivelser, som kan være ganske udtalt den første uge.

Blødning. Hvis det bløder fra operationssåret kan du sætte dig med hovedet op, og holde noget koldt på – det vil i langt de fleste tilfælde klare problemet.

Infektion. Der er, som ved alle andre operationer, risiko for betændelse i operationssåret, dette er dog meget sjældent ved øjenlågsoperationer.

Over / underkorrektion. Musklen som løfter øjenlåget er som en elastik. Det kan i sjældne tilfælde være nødvendigt at udføre en ekstra operation, hvis ikke resultatet er tilfredsstillende efter den første operation.

Vedvarende irritation kan i meget sjældne tilfælde opstå.

Skulle der mod forventning opstå komplikationer skal du enten kontakte mig (normal åbningstid) eller vaglægen.