

YAG-LASER IRIDOTOMI

Yag-Laser iridotomi er en lille operation på regnbuehinden med laserstråler. Behandlingen gives til patienter, med det man kalder "snævre vinker". En snæver vinkel kan ubehandlet føre til akut grøn stær og svær skade på synsnerven.

Med Yag-Laseren dannes et lille hul i regnbuehinden. Dette hul medvirker, at de snævre vinkler åbnes op og afløbet for øjets indre væske bedres. Det gør ikke ondt at få foretaget behandlingen.

På behandlingsdagen skal du møde 30 minutter før den planlagte behandling. Her får du 2 øjendråber som skal virke i 30 minutter før behandlingen gives.

Før selve behandlingen får du en bedøvende øjendråbe, der påsættes en kontaklinse og behandlingen udføres.

Efter behandlingen skal du dryppe med øjendråber Maxidex hver time den første dag, herefter 3 gange dagligt i en uge. Du får en tid til kontrol efter en uge.

Risici ved behandlingen er få og sjældne, herunder:

Blødning i øjets forreste del, som følge af at et lille blodkar er blevet ramt. En sådan blødning standser oftest hurtigt af sig selv.

Gener fra lysindfald, fra det ekstra lille hul i regnbuehinden.

Udvikling af grå stær som følge af beskadigelse af øjets linse.

Sløret syn det første døgn tid er normalt. Der kan også være lidt grus fornemmelse. Kommer der stærke smerter, kvalme eller opkast kontaktes øjenlægen. Aften eller weekend kontaktes vagtlægen.