

Operation for tunge øjenlåg

Operation for tunge øjenlåg/overskydende hud på øjenlåget kaldes også operation for blefarochalasis. Ved denne operation fjernes et bådformet hudstykke og huden syes herefter sammen igen med en tynd tråd. Tråden skal fjernes efter 5-7 dage.

Operationen foretages i lokalbedøvelse. Det gør ondt og spænder når bedøvelsen anlægges. Herefter gør det ikke ondt at blive opereret. Hvis ikke andet er aftalt foretages operationen på begge sider i samme seance.

Hvis du får blodfortyndende medicin skal du gøre lægen opmærksom på det.

Efter operationen bør du holde dig i ro de første dage, samt afstå fra hård fysisk udfoldelse til 5 dage efter at trådene er fjernet. Det kan være en fordel at have noget koldt (frosne ærter, brun sæbe i en frysepose) klar. Dette kan lægges på det opererede område 4 gange dgl. a 15 minutters varighed de første 3 dage.

Risikoen ved denne operation er bla.:

Blå / hævede øjenomgivelser, som kan være ganske udtalt den første uge.

Blødning. Hvis det bløder fra operationssåret kan du sætte dig med hovedet op og holde noget koldt på – det vil i langt de fleste tilfælde klare problemet.

Infektion. Der er, som ved alle andre operationer, risiko for betændelse i operationssåret, dette er dog meget sjældent ved øjenlågsoperationer.

Over / underkorrektio n. Ved underkorrektio n kan der uden problemer fjernes ekstra hud på et senere tidspunkt. Ved overkorrektio n (som er uhyre sjældent) kan der opstå problemer med at lukke øjet helt.

Skulle der mod forventning opstå komplikationer skal du enten kontakte mig (normal åbningstid) eller vaglægen.